

消费者适应症及重要风险信息

GONAL-f[®]（注射用 α 促卵泡激素）和 GONAL-f[®] RFF（注射用 α 促卵泡激素）

关于GONAL-f[®]（注射用 α 促卵泡激素）和 GONAL-f[®] RFF*（注射用 α 促卵泡激素）正确用法及风险的重要信息

GONAL-f[®]（注射用 α 促卵泡激素）和 GONAL-f[®] RFF*（注射用 α 促卵泡激素）有哪些用途？

Gonal-f[®]（多剂量）和 Gonal-f[®] RFF 是 2 种含有促卵泡激素的产品，类似于人卵泡刺激素（简称 FSH）。FSH 属于人类生殖激素。

某些不孕症妇女使用 Gonal-f[®]（多剂量）和 Gonal-f[®] RFF 可促进排卵（产生并排出成熟卵子）和受孕。Gonal-f[®] 对因患有原发性卵巢功能衰竭症而不能产卵的女性无效。Gonal-f[®] 也可用于正在接受辅助生殖技术 (ART) 治疗（如体外受精）的女性，帮助其卵巢产生更多的卵子。

Gonal-f[®]（多剂量）也可促进患有影响产精的罕见病症的男性产精。

两种产品均为处方药，须由擅长不孕症治疗的专科医生开具。

Gonal-f[®] 和 Gonal-f[®] RFF 的不适宜人群

孕妇、认为自己可能怀孕的女性、原发性卵巢功能衰竭（卵巢不能产卵）患者，以及对重组人卵泡刺激素或药物中其它成分过敏的患者，不宜使用 Gonal-f[®]（多剂量）和 Gonal-f[®] RFF。

性器官癌症、脑癌患者以及不受控制的甲状腺或肾上腺疾病患者，不适合使用 Gonal-f[®]（多剂量）和 Gonal-f[®] RFF。有子宫或阴道异常出血病史、卵巢肿大、增大或疼痛的女性，应在开始治疗前告知医生。

Gonal-f[®] 和 Gonal-f[®] RFF 有哪些可能的副作用？

应使用预计能达到所需效果的最低剂量。医生应经常观察女性患者的反应，以免使用过量引发严重副作用，如血凝。

治疗期间如发生腹部或小腹剧痛肿胀、严重反胃、呕吐或体重增加，请及时联系医生。这些可能是罕见而严重的卵巢过度刺激综合征 (OHSS) 的征兆，可能需要住院治疗。

女性使用 Gonal-f[®]（多剂量）或 Gonal-f[®] RFF 可能导致多个卵子受精。这会引起女性并发症以及怀上双胞胎或多胞胎。

女性最常见的副作用有头痛、卵巢囊肿、反胃和鼻窦感染。男性使用 Gonal-f[®]（多剂量）最常见的副作用有暗疮、乳房肿痛和增大以及疲倦。注射会引起一定的不适。

*RFF，改良后的女性配方