

消费者重要风险信息

OVIDREL® 载药注射器 (α 绒毛膜促性腺激素注射液)

关于OVIDREL® 载药注射器 (α 绒毛膜促性腺激素注射液) 正确用法及风险的重要信息:

Ovidrel® 载药注射液 (α 绒毛膜促性腺激素注射液) 有哪些用途?

Ovidrel® 载药注射液中含有 α 重组人绒毛膜促性腺激素 (hCG), 一种注射激素。这种激素可促使卵子成熟和排出。在月经周期的最后阶段, 可以给予 Ovidrel® 载药注射液。擅长不孕不育或生殖健康治疗的医生可为想要孩子但因各种原因需要医疗帮助的女性开具 Ovidrel® 载药注射液处方。在进行全面体检确定具体身体状况后, 如果需要在治疗中采取激素替代或补充疗法, 医生可以开具 Ovidrel® 载药注射液。Ovidrel® 载药注射液可以作为患者整个治疗方案中的一种用药。

Ovidrel® 载药注射液的不适宜人群

孕妇、哺乳期女性、原发性卵巢功能衰竭 (卵巢不能产卵) 患者, 以及对人绒毛膜促性腺激素或药物中其它成分过敏的患者, 不宜使用 Ovidrel® 载药注射液。

性器官癌症、脑癌患者以及不受控制的甲状腺或肾上腺疾病患者, 不适宜使用 Ovidrel® 载药注射液。有子宫或阴道异常出血病史、卵巢肿大、增大或疼痛的女性, 应在开始治疗前告知医生。

正在接受辅助生殖技术 (ART) 和促排卵 (OI) 治疗的不孕女性, 在血清雌二醇和阴道超声波检查表明卵泡发育充分后方可使用 Ovidrel® 载药注射液。

如发生多卵泡发育、具有临床意义的卵巢增大或雌激素分泌过旺等卵巢反应过度情况, 应停止使用 Ovidrel® 载药注射液。

Ovidrel® 载药注射液有哪些可能的副作用?

医生应向您如实告知使用 Ovidrel® 载药注射液的好处及风险。和任何其他药物一样, 如有任何副作用、症状或身体变化, 如实告知医生。

Ovidrel® 载药注射液可能引起严重副作用, 如卵巢过度刺激综合征 (OHSS)、肺及血管疾病。如果出现腹部或小腹剧痛肿胀、严重反胃、呕吐或体重增加, 请及时联系医护人员。

使用生育药可能导致多个卵子受精。这会引起女性并发症以及怀上双胞胎或多胞胎。

女性使用 Ovidrel® 载药注射液最常见的副作用包括腹痛、恶心和呕吐。针筒注射可能会引起一定的不适。