

# **INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR SOBRE LOS RIESGOS DEL MEDICAMENTO OVIDREL® JERINGA PRECARGADA (inyección de coriogonadotropina alfa)**

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL USO ADECUADO Y LOS RIESGOS DE OVIDREL® JERINGA PRECARGADA (inyección de corigonadotropina alfa):**

### **¿Cuáles son los usos de Ovidrel® Jeringa precargada (inyección de coriogonadotropina alfa)?**

Ovidrel® Jeringa precargada contiene coriogonadotropina alfa humana (hCG) recombinante, una hormona inyectable. Esta es la hormona que termina de madurar sus óvulos y permite su liberación. Pueden recetarle Ovidrel® Jeringa precargada para completar esta etapa final de su ciclo. Los médicos especialistas en esterilidad o salud reproductiva recetan Ovidrel® Jeringa precargada a las mujeres que intentan tener un hijo pero que, por diferentes motivos, necesitan asistencia médica para lograrlo. Después de realizar un examen médico integral para determinar su afección médica específica, su médico puede recetarle Ovidrel® Jeringa precargada si necesita un reemplazo o complemento hormonal como parte de su programa de tratamiento. Ovidrel® Jeringa precargada puede ser uno de varios medicamentos que se recetan a los pacientes como parte de un programa de tratamiento.

### **¿Quiénes no deben usar Ovidrel® Jeringa precargada?**

Ovidrel® Jeringa precargada no debe usarse en pacientes que estén embarazadas o en período de lactancia, pacientes con insuficiencia ovárica primaria (los ovarios ya no producen óvulos) ni en pacientes con alergia a la hCG o a alguno de los demás ingredientes del medicamento.

Las pacientes con antecedentes de cáncer de órganos sexuales o cerebral, enfermedad tiroidea o suprarrenal no controlada no deben usar Ovidrel® Jeringa precargada. Las mujeres con antecedentes de sangrado poco frecuente en el útero o la vagina, u ovarios inflamados, agrandados o doloridos deben hablar con su médico antes de comenzar el tratamiento.

En mujeres infértiles que están bajo tratamiento con tecnologías de reproducción asistida (TRA) e inducción ovulatoria (IO), Ovidrel® Jeringa precargada no debe administrarse hasta determinar un correcto desarrollo folicular mediante la medición del estradiol sérico y una ecografía transvaginal.

La administración de Ovidrel® Jeringa precargada debe suspenderse en casos en los que exista una respuesta ovárica excesiva, confirmada mediante un desarrollo multifolicular, un agrandamiento ovárico clínicamente significativo o una producción excesiva de estradiol.

### **¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ovidrel® Jeringa precargada?**

Su médico debe informarle los riesgos y los beneficios de utilizar Ovidrel® Jeringa precargada. Al igual que con cualquier medicamento, informe todos los efectos secundarios, síntomas o cambios físicos a su médico.

Ovidrel® Jeringa precargada puede provocar graves efectos secundarios, incluido el síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO), y problemas pulmonares y en los vasos sanguíneos. Consulte a su médico si presenta dolor intenso o inflamación en el área del estómago o la pelvis, dolor de estómago intenso, vómitos o aumento de peso.

El uso de medicamentos para la esterilidad puede relacionarse con la fertilización de más de un óvulo. Esto puede generar complicaciones para la madre y el nacimiento de dos o más bebés.

Los efectos secundarios más frecuentes en las mujeres que usan Ovidrel® Jeringa precargada incluyen dolor abdominal, náuseas y vómitos. Las inyecciones con aguja pueden causar ciertas molestias.