

# Instrucciones de administración y almacenamiento de Ovidrel® jeringa prellenada (coriogonadotropina alfa para inyección)



Antes de inyectar Ovidrel® jeringa prellenada, lea las siguientes instrucciones cuidadosamente.

Para obtener más información sobre la administración y el almacenamiento de Ovidrel® jeringa prellenada, consulte la información completa de prescripción adjunta.

Ovidrel® jeringa prellenada está destinada a la inyección subcutánea única. Todo el material que no se use debe desecharse.

## Administración de Ovidrel® jeringa prellenada (coriogonadotropina alfa para inyección)

### Prepárese

1. Asegúrese de que tenga todos los materiales necesarios reunidos en una zona limpia: Ovidrel® jeringa prellenada, paños embebidos en alcohol, gasa y recipiente para desechar elementos cortantes.



Ovidrel® Jeringa Prellenada

Deje que la jeringa prellenada se adapte a la temperatura ambiente antes de administrar la inyección.



Recipiente para desechar elementos cortantes\*




Gasa\*




Paños embebidos en alcohol\*

\*El kit no incluye el material.



2. Lávese las manos cuidadosamente.

## Prepare el lugar de la inyección



3. Elija un lugar para la inyección en el estómago, preferiblemente alrededor del ombligo, pero con una separación de 1 pulgada como mínimo.



4. Limpie con cuidado el lugar de la inyección con un paño embebido en alcohol y deje que se seque al aire.

## Prepare su Ovidrel® Jeringa Prellenada



5. Con la jeringa apuntando hacia arriba, quite cuidadosamente la tapa de la aguja de la jeringa. No toque la aguja ni permita que esta toque ninguna superficie.

## Almacenamiento de Ovidrel® jeringa prellenada (coriogonadotropina alfa para inyección)

### Importante:

Ovidrel® jeringa prellenada (coriogonadotropina alfa para inyección) debe almacenarse refrigerada (36–46 °F/2–8 °C) para permitir que se use el producto hasta la fecha de vencimiento que se muestra en la jeringa o en la caja. Alternativamente, el paciente puede almacenar Ovidrel® jeringa prellenada durante un máximo de 30 días a temperatura ambiente (hasta 77 °F/25 °C) y en este caso debe usarse dentro de esos 30 días. Almacene protegido de la luz. No congele. Deseche el material sin usar.

## Prepárese para conocer más sobre los productos de EMD Serono para la esterilidad


Visite [fertilitylifelines.com](http://fertilitylifelines.com) para obtener una variedad de materiales de soporte para los medicamentos, incluidos los videos instructivos sobre el ajuste de la dosis y la administración de Ovidrel® jeringa prellenada (coriogonadotropina alfa para inyección), y para seleccionar otros medicamentos de EMD Serono para la esterilidad.

# Instrucciones de administración y almacenamiento de Ovidrel® jeringa prellenada (coriogonadotropina alfa para inyección) (continuación)



Revise estas instrucciones cuidadosamente. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su profesional sanitario.

## Prepare su Ovidrel® jeringa prellenada



**6.** Para retirar cualquier burbuja de aire, apunte la aguja hacia arriba y golpee suavemente la jeringa hasta que todas las burbujas hayan subido a la parte superior.



**7.** Empuje el émbolo cuidadosamente hasta que comience a aparecer una pequeña gota de líquido en la punta de la aguja.


## Administre su inyección




**8.** Sujete la jeringa con una mano, como sujetaría un lápiz, y con la otra mano pellizque la piel en el lugar elegido para la inyección y sujete con firmeza.




**10.** Suelte la piel y empuje el émbolo con un movimiento lento y continuo hasta que se haya inyectado todo el medicamento. Tómese todo el tiempo que necesite para inyectar todo el contenido.



**12.** Ejercer presión en el lugar de la inyección con una almohadilla de gasa. Si el sangrado no se detiene en unos pocos minutos, coloque un trozo de gasa limpia sobre el lugar de la inyección y cúbrala con una venda adhesiva.



**9.** Introduzca la longitud completa de la aguja en la piel a un ángulo ascendente de aproximadamente 45 a 90 grados, como lo indicó su médico o enfermero.



**11.** Luego de inyectar todo el contenido, retire suavemente la aguja.

## Deseche el material usado



**13.** Deseche la jeringa en su recipiente para desechar elementos cortantes. Los materiales para la inyección no pueden volver a usarse.

**Realice siempre las inyecciones como lo indicó su médico.**

### Indicación:

Ovidrel® jeringa prellenada está indicada para la inducción de la fase final de la maduración folicular y la luteinización temprana en mujeres estériles que han experimentado desensibilización hipofisaria y que recibieron un tratamiento previo apropiado con hormonas foliculoestimulantes como parte del programa de tecnología de reproducción asistida tales como la fertilización in vitro y la transferencia de embriones. Ovidrel® jeringa prellenada también está indicada para la inducción de la ovulación y el embarazo en pacientes infértiles anovulatorias en las cuales la causa de la infertilidad es funcional y no se debe a una insuficiencia ovárica primaria. Ovidrel® jeringa prellenada únicamente debe estar recetada por médicos especializados en problemas de esterilidad y su tratamiento.

### Información importante sobre riesgos:

Ovidrel® jeringa prellenada está contraindicada en mujeres con sensibilidad previa a las preparaciones con gonadotropina coriónica humana o sus ingredientes, insuficiencia ovárica primaria, disfunción de las glándulas tiroideas o suprarrenal no controlada y en mujeres embarazadas. Las madres que amamantan tampoco deberían usar Ovidrel® jeringa prellenada. Los efectos secundarios más frecuentes en las mujeres que usan Ovidrel® jeringa prellenada incluyen dolor abdominal, reacciones en el lugar de la inyección, náuseas y vómitos. Informe a su médico si experimenta dolor pélvico o abdominal intenso, náuseas, vómitos y/o aumento de peso, ya que estos pueden ser signos de un evento médico grave. Se han relacionado nacimientos múltiples informados con el tratamiento de Ovidrel® jeringa prellenada.

Lea la información completa de prescripción (PI) para obtener los detalles del producto y hable con su profesional sanitario.